

Communiqué de presse

Première estimation de l'incidence du VIH auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes fréquentant des établissements de convivialité gay parisiens

11 février 2010

Une première estimation de l'incidence du VIH auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et fréquentant des établissements de convivialité gay parisiens est désormais disponible, grâce à de nouveaux résultats de l'enquête « Prévagay ». Menée par l'Institut de veille sanitaire (InVS), avec le soutien scientifique et financier de l'Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS), en partenariat avec le Syndicat national des entreprises gaies (Sneg) et le Centre national de référence du VIH (Tours), l'enquête Prévagay s'est déroulée à Paris du 28 avril au 6 juin 2009 dans des établissements de convivialité gay.

L'enquête Prévagay avait deux objectifs. Il s'agissait d'estimer la prévalence de l'infection par le VIH chez les HSH fréquentant ces lieux : le pourcentage de personnes séropositives dans cette population a été estimé à 17,7 % (cf. communiqué de presse du 17/11/2009). Elle devait également permettre de déterminer l'incidence du VIH dans cette population, c'est-à-dire le nombre de nouvelles infections par an.

Environ 900 HSH ont participé à cette enquête et accepté un prélèvement biologique (gouttes de sang auto-prélevé au bout du doigt). Par l'utilisation du test d'infection récente sur ces prélèvements, le taux d'incidence du VIH a été estimé dans cette population à 7,5 cas pour 100 personnes par an (intervalle de confiance à 95% : 4,5-10,5). Ce qui traduit que dans cette population, parmi 100 HSH séronégatifs, plus de 7 personnes se contaminent en une année (entre 4,5 et 10,5 si on tient compte de l'intervalle de confiance).

L'incidence du VIH dans l'enquête Prévagay (7,5%) est beaucoup plus élevée que l'incidence du VIH pour l'ensemble de la population homosexuelle en France (1%, cf. communiqué de presse du 19/11/2009). Les HSH fréquentant les établissements de convivialité gay parisiens représentent une population spécifique. L'incidence estimée dans cette population ne peut donc pas être généralisée à l'ensemble de la population des HSH en France mais est préoccupante. Elle montre que la transmission du VIH est très élevée au sein de ce groupe de population. Des actions de prévention et de dépistage spécifiques et novatrices doivent être engagées de manière urgente.

Pour en savoir plus, consultez le site internet dédié : www.prevagay.fr

Contacts presse :

InVS : Laetitia Gouffé-Benadiba

ANRS : Marie-Christine Simon

SNEG : Antonio Alexandre (Directeur Prévention)

01 41 79 67 08 l.benadiba@invs.sante.fr

01 53 94 60 32 information@anrs.fr

01 44 59 95 12 directeur@sneg.org