

Communiqué de presse

ENQUETE PRESSE GAY 2004 : PUBLICATION DU RAPPORT FINAL

21 juin 2007

L'Institut de veille sanitaire (InVS) et l'Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (Anrs), publient, le 22 juin 2007 le rapport final et une synthèse de l'Enquête Presse Gay (EPG) réalisée fin 2004 auprès d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH).

Depuis vingt ans, l'EPG suit les comportements sexuels préventifs des homosexuels lecteurs de la presse gay, leurs modes de vie et de sociabilité par l'insertion de questionnaires dans la presse identitaire.

L'enquête menée en 2004 a permis de recueillir plus de 6 000 questionnaires remplis par des hommes grâce à l'implication de 16 titres de la presse écrite identitaires et de 10 sites Internet.

Outre les comportements sexuels à risque et leurs évolutions au sein de la population enquêtée, sont abordés, le recours aux dépistages, les prévalences déclarées du VIH, les questions d'estime de soi ou encore les consommations de substances psychoactives.

Les premiers résultats de cette enquête avaient été communiqués le 22 juin 2005 au cours d'une conférence de presse conjointement menée par l'InVS et l'Anrs confirmant la progression des comportements sexuels à risque constatée depuis 1997.

Parmi les nouveaux éléments révélés dans ce rapport figurent l'identification de situations de souffrance psychique. Près de la moitié des participants indiquent avoir eu une dépression au cours de leur vie ; leurs consommations d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs sont plus importantes que celles relevées en population générale. De même, les tentatives de suicide au cours de la vie sont plus fréquentes, et concernent près d'un participant sur cinq.

Même si, depuis deux décennies, le sentiment d'acceptation de l'orientation sexuelle des répondants homosexuels par leur entourage s'est accru, il n'en reste pas moins que près d'un tiers d'entre eux a été victime d'actes homophobes dans l'année.

Cette étude révèle également une importante consommation de substances psychoactives dans la population enquêtée. Il s'agit principalement de poppers (37%) et de cannabis (28%), en augmentation depuis 1997. Ces niveaux de consommations de substances psychoactives sont plus élevés qu'en population générale.

La publication de ce rapport devrait permettre de développer ces axes de recherches et renouveler les messages de prévention en direction de la population des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.